



SWISSRECA

Rapport succinct 2023 ^{H3}

Sensibilisation

7'207
OHCA enregistrés en Suisse

Incidence 82/100'000 habitants

Age moyen de tous les OHCA 68 ans

Domicile 67%

Rue / espace public 15%

Autres lieux d'intervention 18%

Hommes 68% Hommes | **67 ans**

Femmes 32% Femmes | **71 ans**

PHASE DE PRÉPARATION

157'000
participant-e-s à des cours BLS-AED-SRC

Aptitude

68% des cas ont été identifiés comme des arrêts cardiaques au téléphone

61% des arrêts cardiaques observés ont été suivis d'une RCP pratiquée par des premiers secouristes

45% des appelant-e-s ont pu être guidé-e-s pour mettre en œuvre des mesures de RCP

51% des arrêts cardiaques observés ont été suivis d'une RCP pratiquée par des premiers secouristes dans les 3 minutes

144 Identification et alarme

Premiers secours spontanés

10% Dans des cas, un AED a été utilisé par des premiers secouristes

27% Dans des cas, une défibrillation a été réalisée dans les 5 minutes après l'alarme

PHASE PRÉHOSPITALIÈRE

35% Dans des cas (2543), des First Responder sont intervenus

84% Dans des cas, ils étaient sur place avant le service de sauvetage

Premiers secours organisés

Le Registre suisse des arrêts cardiaques extrahospitaliers (SWISSRECA) saisit des données complètes sur les différents maillons de la chaîne de sauvetage. Il est géré par l'Interassociation de sauvetage (IAS) et soutenu par le Swiss Resuscitation Council (SRC). Autres informations et contact www.swissreca.ch.

Tous les chiffres se rapportent à la période 1.1.-31.12.2023. Les pourcentages ont été arrondis mathématiquement.

Ce symbole ^{A1} renvoie à l'objectif correspondant tiré de la Stratégie nationale de survie relative à l'arrêt cardiaque, version 2023.

CLINIQUE

Secours professionnels

83% ont été pris en charge par les services de sauvetage dans les 15 minutes

26% présentaient un rythme cardiaque défibrillable

[*Se réfère aux personnes concernées issues de cantons avec ≥ 80 % de données sur les résultats. Détails : voir rapport détaillé sur www.swissreca.ch]

Prise en charge hospitalière

31% des personnes ayant bénéficié d'une réanimation extra-hospitalière ont été amenées à l'hôpital avec une activité circulatoire rétablie

89% ont été amenées directement dans un hôpital spécialisé dans ce genre d'événements

RÉSULTATS

12% ont quitté l'hôpital en vie, *

31% dans le groupe Utstein

93% de ces personnes présentaient un bon statut neurologique

96% dans le groupe Utstein

Mesure de l'efficacité